

Therapie Diabetes mellitus bei dem Hund

Handhabung des Caninsulins (=Insulin)

- Insulin im Kühlschrank lagern.
- Nach Anbruch kann das Insulin 42 Tage lang verwendet werden.
- Vor Entnahme das Fläschchen bitte kräftig schütteln.
- Bitte nur die Insulinspritzen mit 40 I.U. verwenden.

Dosierung für Ihren Hund

Je morgens und abends, möglichst im 12 Stunden Abstand werden _____ I.U. (=Einheiten) unter die Haut gespritzt.

Sollte Ihr Hund nicht fressen oder sogar erbrechen, dann nur die Hälfte der gewohnten Insulindosis spritzen.

Fütterung Ihres Hundes

Morgens und abends vor der Insulininjektion wird je die Hälfte der Tagesration gefüttert (bitte abwiegen). Verzichten Sie auf Leckereien zwischendurch. Idealerweise füttern Sie eine spezielle Diät (z.B. Royal Canin Diabetic oder Hills w/d oder r/d). Wir beraten Sie diesbezüglich gerne.

Symptome für Unterzuckerung (Hypoglykämie)

- Ruhelosigkeit, Nervosität, Zittern, Fresslust, Orientierungslosigkeit, Schwäche
- Krampfanfälle, Ataxie, Bewusstlosigkeit, Koma

Maßnahmen bei Unterzuckerung

- Füttern Sie Ihrem Hund eine kleine Portion.
- Schmieren Sie ihm Honig ins Maul oder spritzen Sie ihm eine Zuckerlösung ins Maul (1g Zucker pro Kg Körpergewicht), wenn er nicht fressen mag.
- Bei Bewusstlosigkeit geben Sie ihm Traubenzucker in die Lefzen und auf das Zahnfleisch.
- Kontaktieren Sie in jedem Fall unsere Notfallsprechstunde.

Nachkontrollen

In den ersten 2 Monaten erfolgen die Nachkontrollen ca. alle 2 Wochen. Bitte füttern und spritzen Sie Ihren Hund wie gewohnt, bevor Sie zu uns kommen. Es wird eine Urin- und Blutuntersuchung erfolgen. Zusätzlich wird ein Blutzuckertagesprofil erstellt. Ihr Liebling muss dafür den Tag über bei uns bleiben. Dies ist wichtig, um Ihren Hund optimal auf das Insulin einzustellen.

Zögern Sie nicht, uns jederzeit bei Fragen, Sorgen oder Problemen zu kontaktieren.